

NUTRICIA Fortimel[®] Protein 125 ml



SABOR FRUTOS ROJOS



SENSACIÓN DE FRESCOR

Contiene derivados del mentol que activan el sistema trigémino y aporta sensación de frescor.

Fortimel Protein 125 ml es un suplemento nutricional **hiperproteico** (24% proteínas) e **hipercalórico** (2,4 kcal/ml), que ayuda a satisfacer las necesidades nutricionales de pacientes en riesgo de desnutrición asociado a la enfermedad. Debe administrarse bajo supervisión del profesional de la salud.

Análisis medio por 100 ml:					
Valor energético	1032	kJ	Ácido fólico	80,9	µg
	245	kcal	Vit. B ₁₂	0,90	µg
Grasas (35 En%)	9,6	g	Biotina	10,1	µg
de las cuales			Vit. C	30,7	mg
- Saturadas	0,86	g	Minerales y elementos traza		
Hidratos de carbono (41 En%)	25,3	g	Na	40,0	mg
de los cuales		g	K	97,6	mg
- Azúcares	13,7	g	Cl	60,0	mg
- Lactosa	<0,35	g	Ca	350	mg
Fibra alimentaria (0 En%)	0	g	P	282	mg
Proteínas (24 En%)	14,6	g	Mg	54,0	mg
Sal	0,08	g	Fe	2,19	mg
Vitaminas			Zn	2,58	mg
Vit. A	288	µg	Cu	0,35	mg
Vit. D	2,08	µg	Mn	0,64	mg
Vit. E	4,90	mg (α-TE)	F	0,20	mg
Vit. K	18,9	µg	Mo	21,5	µg
Tiamina	0,52	mg	Se	15,4	µg
Riboflavina	0,56	mg	Cr	13,0	µg
Niacina	(4,12 mg NE) 0,70	mg	I	49,0	µg
Ácido pantoténico	1,53	mg	Otros		
Vitamina B ₆	0,61	mg	Colina	99,4	mg
			Osmolaridad	570	mOsmol/l

Ingredientes: Agua, maltodextrina, proteínas (de **leche** de vaca), azúcar, aceites vegetales (aceite de canola, aceite de girasol), aromas, hidrógenofosfato de magnesio, emulgente (lecitina de **soja**), cloruro de colina, L-ascorbato de sodio, citrato de potasio, fosfato dipotásico, lactato ferroso, acetato de DL-α-tocoferil, gluconato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, nicotinamida, riboflavina, acetato de retinilo, fluoruro sódico, ácido pteroilmonoglutámico, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, D-biotina, fitomenadiona, yoduro potásico, colecalciferol, cianocobalamina.

NUTRICIA **Fortimel**[®] Protein 125 ml



POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

De 1 a 2 botellas al día, o según determine el profesional sanitario



CONTRAINDICACIONES

No es adecuado para pacientes con galactosemia.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

- ✓ Para uso enteral exclusivamente. No administrar por vía parenteral.
- ✓ Debe utilizarse bajo supervisión del profesional sanitario.
- ✓ No es adecuado para ser consumido como única fuente de alimentación.
- ✓ No es adecuado para niños menores de 3 años. Utilizar con precaución en niños de 3 a 6 años.
- ✓ Controlar la ingesta de líquidos para asegurar una hidratación adecuada.



CONSERVACIÓN

- ✓ Almacenar en lugar fresco y seco.
- ✓ Agitar bien antes de utilizar.
- ✓ Listo para su uso y se recomienda tomarlo frío.
- ✓ Una vez abierta, conservar la botella cerrada en la nevera durante un máximo de 24 horas.
- ✓ Envasado en atmósfera protectora.